



Lys jardins
Soyez l'artisan de votre jardin

FICHE RAVAGEUR

Identifier, comprendre et maîtriser les parasites et maladies du jardin

PUCERON DU LAURIER-ROSE

Aphis nerii

DÉTAIL



Type :
Insecte piqueur-suceur



Cycle :
Multiplication très rapide, plusieurs générations



Plantes sensibles :
Dipladénia, laurier-rose, pervenche, mandevilla



Contexte :
Chaleur, air sec, jeunes pousses tendres



Nuisibilité :
Affaiblissement, déformation, miellat, fumagine



POURQUOI APPARAÎT-IL ?

Il apparaît surtout sur les pousses jeunes et tendres, en période chaude. Une plante un peu stressée, peu ventilée ou trop fertilisée en azote devient plus attractive. Les colonies se développent très vite sur les boutons et les tiges.



COMMENT LE RECONNAÎTRE ?

On observe de petits pucerons jaune orangé, souvent groupés en colonies sur les jeunes tiges, les boutons floraux et le revers des feuilles. Ils laissent un miellat collant, attirent parfois les fourmis et peuvent favoriser une fumagine noire.



Surveillance régulière

**EFFICACITÉ
BONNE**



Jet d'eau /
retrait manuel

**EFFICACITÉ
BONNE**



Savon noir

**EFFICACITÉ
BONNE**



Pyrèthre si besoin

**EFFICACITÉ
MOYENNE**

MOYENS DE LUTTE



CONSEIL LYS JARDINS

Sur dipladénia, commencez par éliminer les colonies les plus visibles à la main ou avec un jet d'eau doux. Pulvérisez ensuite du savon noir en insistant sur les jeunes tiges et les boutons, puis renouvelez 2 à 3 fois à quelques jours d'intervalle. En cas de forte attaque, un traitement à base de pyrèthre peut être envisagé, de préférence le soir.



07 71 77 47 98



www.lys-jardins.com



Lys jardins

Soyez l'artisan de votre jardin

FICHE RAVAGEUR

Identifier, comprendre et maîtriser les parasites et maladies du jardin



PUCERON VERT

Aphididae

DÉTAIL



Type :

Insecte piqueur-suceur



Cycle :

Multiplication très rapide, plusieurs générations par an



Plantes sensibles :

Dipladénia, rosiers, laurier-rose, agrumes, jeunes pousses tendres



Contexte :

Temps doux, pousse tendre, excès d'azote, plante fragilisée



Nuisibilité :

Déformations, miellat collant, fumagine, affaiblissement



POURQUOI APPARAÎT-IL ?

Le puceron vert apparaît surtout sur les jeunes pousses tendres. Il profite d'une croissance rapide de la plante, d'un excès d'azote et d'un temps doux. Les sujets déjà stressés ou peu surveillés peuvent être colonisés très vite.



COMMENT LE RECONNAÎTRE ?

On observe de petites colonies de pucerons verts regroupées sur les tiges, les boutons et le revers des feuilles. Les pousses se déforment, deviennent collantes à cause du miellat, et des fourmis peuvent être attirées.



Surveillance régulière

EFFICACITÉ
BONNE



Jet d'eau ciblé

EFFICACITÉ
BONNE



Savon noir

EFFICACITÉ
BONNE



Coccinelles / larves

EFFICACITÉ
BONNE

MOYENS DE LUTTE



CONSEIL LYS JARDINS

Le puceron vert se combat d'abord avec des méthodes douces : surveillance, jet d'eau, retrait manuel si besoin, puis savon noir bien dilué appliqué de préférence le soir. Les coccinelles et surtout leurs larves sont très efficaces sur ce type de pucerons. Limitez les excès d'engrais azotés pour éviter les pousses trop tendres et trop attractives.



07 71 77 47 98



www.lys-jardins.com